ビタミンB_{12}	0.1μg以上1.5μg以下
ビタミンC	10mg以上70mg以下
ビタミンD	1.0μg以上2.5μg以下
ビタミンE	0.5mg以上5.0mg以下
葉酸	10μg以上50μg以下
イノシトール	４mg以上40mg以下
亜鉛	0.5mg以上1.5mg以下
塩素	50mg以上160mg以下
カリウム	60mg以上180mg以下
カルシウム	50mg以上140mg以下
鉄	0.45mg以上
銅	35μg以上120μg以下
セレン	１μg以上5.5μg以下
ナトリウム	20mg以上60mg以下
マグネシウム	５mg以上15mg以下
リン	25mg以上100mg以下
α―リノレン酸	0.05ｇ以上
リノール酸	0.3ｇ以上1.4ｇ以下
熱量	60kcal以上70kcal以下

注(1)　窒素換算係数として6.25を乗じるものとする。
注(2)　ナイアシンにあっては、ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量とする。
注(3)　ビタミンAにあっては、レチノールの量とする。

乳児用調製液状乳	乳児用調製粉乳の項に定める規格を準用する。	一　「乳児用調製液状乳」の文字 二　当該食品は母乳の代替食品として使用できるものであるが、乳児にとっては母乳が最良である旨