（削る）

（削る）

（削る）

鉛標準原液　硝酸鉛（Ⅱ）159.8mgを10％硝酸10mLに溶かし、水を加えて正確に100mLとする。本液１mLは鉛１mgを含む。

（削る）

（削る）

鉛標準溶液（重金属試験用）　鉛標準原液１mLを正確に量り、水を加えて正確に100mLとする。用時調製する。本液１mLは鉛10μgを含む。

（削る）

（削る）

（削る）

ヒ素標準原液　三酸化二ヒ素を微細な粉末とし、105℃で４時間乾燥し、その0.10ｇを精密に量り、水酸化ナトリウム溶液（１→５）５mLを加えて溶かす。この液を硫酸（１→20）で中和し、更に硫酸（１→20）10mLを追加し、新たに煮沸し冷却した水を加えて正確に1,000mLとする。本液１mLは三酸化二ヒ素0.1mgを含む。

ヒ素標準溶液　ヒ素標準原液10mLを正確に量り、硫酸（１→20）10mLを加え、新たに煮沸し冷却した水を加えて正確に1,000mLとする。本液１mLは、三酸化二ヒ素１μgを含む。用時調製し、共栓瓶に保存する。

（削る）

（削る）

（削る）

ゲルマニウム標準溶液　ゲルマニウム標準原液１mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとする。その１mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとする。本液１mLはゲルマニウム0.1μgを含む。

ゲルマニウム標準溶液（乳等の容器包装試験用）　ゲルマニウム標準原液１mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとする。その0.5mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとする。本液１mLはゲルマニウム0.05μgを含む。

ジブチルスズ標準溶液　二塩化ジブチルスズ100mgにアセトン及び塩酸２～３滴を加えて溶かした後、アセトンを加えて100mLとする。その１mLを採り、ヘキサン及び塩酸２～３滴を加えて1,000mLとする。本液１mLは二塩化ジブチルスズ１μgを含む。

鉛標準原液　硝酸鉛（Ⅱ）159.8mgを10％硝酸10mLに溶かし、水を加えて100mLとする。本液１mLは鉛１mgを含む。

鉛標準溶液　鉛標準原液１mLを採り、試験溶液と同じ溶媒を用いて200mLとする。ただし、試験溶液が水の場合には硝酸を５滴加える。本液１mLは鉛５μgを含む。

鉛標準溶液（金属缶試験用）　鉛標準溶液８mLを採り、浸出用液と同じ溶媒を用いて100mLとする。ただし、浸出用液が水の場合には硝酸５滴を加える。本液１mLは鉛0.4μgを含む。

鉛標準溶液（重金属試験用）　鉛標準原液１mLを採り、水を加えて100mLとする。用時調製する。本液１mLは鉛10μgを含む。

乳酸標準溶液　Ｌ－乳酸リチウム1.07ｇを採り、水を加えて1,000mLとする。この液３mLを採り、水を加えて100mLとする。本液１mLは乳酸30μgを含む。

バリウム標準原液　硝酸バリウム190.3mgを0.1mol／Ｌ硝酸に溶かして100mLとする。本液１mLはバリウム１mgを含む。

バリウム標準溶液　バリウム標準原液１mLを採り、0.1mol／Ｌ硝酸を加えて1,000mLとする。本液１mLはバリウム１μgを含む。

ヒ素標準原液　三酸化二ヒ素を微細な粉末とし、105℃で４時間乾燥し、その0.10ｇを量り、水酸化ナトリウム溶液（１→５）５mLを加えて溶かす。この液を硫酸（１→20）で中和し、更に硫酸（１→20）10mLを追加し、新たに煮沸し冷却した水を加えて1,000mLとする。本液１mLは三酸化二ヒ素0.1mgを含む。

ヒ素標準溶液　ヒ素標準原液10mLを採り、硫酸（１→20）10mLを加え、新たに煮沸し冷却した水を加えて1,000mLとする。本液１mLは、三酸化二ヒ素１μgを含む。用時調製し、共栓瓶に保存する。

ヒ素標準溶液（乳等の容器包装試験用）　ヒ素標準原液５mLを採り、硫酸（１→20）10mLを加え、新たに煮沸し冷却した水を加えて1,000mLとする。本液１mLは、三酸化二ヒ素0.5μgを含む。用時調製し、共栓瓶に保存する。

フェノール標準溶液　フェノール1.0ｇを水に溶かして100mLとし、その１mLを採り、水を加えて100mLとする。更にこの液１mLを採り、水を加えて20mLとする。本液１mLはフェノール５μgを含む。

メタクリル酸メチル標準溶液　メタクリル酸メチル1.5ｇを採り、20％エタノールに溶かして1,000mLとする。この液１mLを採り、20％エタノールを加えて100mLとする。本液１mLはメタクリル酸メチル15μgを含む。