1681　５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２，２－ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・３－ヒドロキシ－２－(ヒドロキシメチル)－２－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ(オキシエタン－１，２－ジイル)・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ(オキシブタン－１，４－ジイル)・１，１′－（フェニルアザンジイル）ジ（プロパン－２－オール）重付加物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4029

1682　安息香酸・ナフタレン－２，６－ジカルボン酸・ノナン－１，９－ジアミン・２－メチルオクタン－１，８－ジアミン重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―4030

1683　２－デシルテトラデシル＝プロパ－２－エノアートを主成分（95％以上）とする、２－デシルテトラデカン－１－オールとプロパ－２－エン酸の反応生成物　(2)―4316

1684　シクロプロピルメチル＝（３*Z*）－ヘキサ－３－エノアート　(3)―4753

1685　２，２，４，４－テトラメチルシクロブタン－１，３－ジオール　(3)―4754

1686　［７，７，９－トリメチル－４，13－ジオキソ－３，14－ジオキサ－５，12－ジアザヘキサデカン－１，16－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）と７，９，９－トリメチル－４，13－ジオキソ－３，14－ジオキサ－５，12－ジアザヘキサデカン－１，16－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）］を主成分(95％以上)とする、１，６－ジイソシアナト－２，２，４－トリメチルヘキサンと１，６－ジイソシアナト－２，４，４－トリメチルヘキサンと２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートの反応生成物　(2)―4317

1687　２，２′－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする、エチル＝プロパ－２－エノアート・エテニルベンゼン・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4157

1688　（エテニルオキシ）シクロヘキサン・４－(エテニルオキシ)ブタン－１－オール・１，１－ジフルオロエテン・テトラフルオロエテン・α－［ブチルジ（メチル）シリル］－ω－{３－[(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］プロピル} ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり、溶媒から単離したものが水、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―4031

1689　末端に２－シアノプロパン－２－イル基を有する、(２－オキソ－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソヘキサヒドロ－２*H*－３，５－メタノシクロペンタ[*b*]フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4158

1690　イソフタロイル＝ジクロリド・テレフタロイル＝ジクロリド・フェノキシベンゼン重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―4032

1691　２，２′－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする、エチル＝プロパ－２－エノアート・２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・エテニルベンゼン・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4159

1692　３－スルファニルプロパン酸を連鎖移動剤とする、２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝プロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシプロピル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・α－メチル－ω－[(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）共重合物のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4033

1693　フラン－２，５－ジオン・[８，８′－（４－ヘキシル－３－オクチルシクロヘキサン－１，２－ジイル）ジ（オクタン－１－アミン）を主成分とする、不飽和脂肪酸（C＝18）の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸を還元しアミノメチル化して得られるダイマージアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)］・１*H*，３*H*－ベンゾ[１，２－*c*：４，５－*c*′]ジフラン－１，３，５，７－テトラオン重縮合物（ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4034

1694　４，４－ジメチル－２，６－ジオキサ－１，７（1），３，５（1，４）－テトラベンゼナヘプタファン－1^{4}，7^{4}－ジアミン・４，４－ジメチル－２，６－ジオキサ－１，７（５）－ビス([２］ベンゾフラナ）－３，５（1，４)－ジベンゼナヘプタファン－1^{1}，1^{3}，7^{1}，7^{3}－テトラオン・フラン－２，５－ジオン・４，４′－メチレンビス（２，６－ジエチルアニリン）重縮合物（ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4035

1695　硫黄と（プロパ－２－エンニトリル重合物の環化反応生成物）の反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4160

1696　２－(ジメチルアミノ)エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・*N*－ベンジル－*N*，*N*－ジメチル－２－[(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エタン－１－アミニウム＝クロリド共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4161

1697　*N*－［４－({４－[(シクロヘキシルカルバモイル）アミノ]フェニル}メチル）フェニル］－*N*′－（４－ドデシルフェニル）尿素(主成分、50％以上）と*N*，*N*′′－［メチレンジ（４，１－フェニレン)］ビス（*N*′－シクロヘキシル尿素）と*N*，*N*′′－[メチレンジ(４，１－フェニレン)]ビス［*N*′－（４－ドデシルフェニル）尿素］の混合物　(4)―2036

1698　１－（４－メトキシフェニル)－２－メチル－２－(モルホリン－４－イル）プロパン－１－オン　(5)―7140

1699　エテニルベンゼン・２，６－ジメチルオクタ－２，４，６－トリエン・６，６－ジメチル－２－メチリデンビシクロ［３．１．１］ヘプタン・２，６，６－トリメチルビシクロ［３．１．１］ヘプタ－２－エン・１－メチル－４－（プロパ－１－エン－２－イル）シクロヘキサ－１－エン共重合物（開環重合物を含むものに限る。)の水素化反応生成物　(6)―4162

1700　[(１－メトキシ－２－メチルプロパ－１－エン－１－イル）オキシ］（トリメチル）シラン　(2)―4318

1701　ジアクアビス（オキサラト－$\kappa^{2}O$，*O*′）オキシドニオブ酸（１－）アンモニウムとジアクアビス（オキサラト－$\kappa^{2}O$，*O*′）オキシドニオブ酸（１－）アンモニウム－水（１／*n*）の混合物　(2)―4319

1702　デカン二酸・12－ヒドロキシオクタデカン酸・ブタン－１，４－ジオール重縮合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が２％以下であるものに限る。）　(7)―4036

1703　エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・[片末端に（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ基を有する、ブタ－１，３－ジエン重合物の水素化反応生成物]・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ブトキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4163

1704　ドデカン－１－チオールを連鎖移動剤とする、エテニルベンゼン・ブチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸共重合物のカリウム及びナトリウム塩（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4164