1726　［エタン－１，２－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物と２，２′－オキシジ（エタン－１－オール）の付加反応生成物］と（フェノキシメチル）オキシランの付加反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4177

1727　２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・１－エテニルピロリジン－２－オン・ドデシル＝プロパ－２－エノアート・４－ヒドロキシブチル＝プロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4178

1728　１－エテニルピロリジン－２－オン・４－ヒドロキシブチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4179

1729　５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）重付加物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4043

1730　３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオン・［５，５′－ビ－２－ベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオン・α－（プロパ－２－エノイル）－ω－｛２－ヒドロキシ－３－［（プロパ－２－エノイル）オキシ］プロポキシ｝ポリ［オキシ（２－ヒドロキシプロパン－１，３－ジイル）オキシ－１，４－フェニレン－９*H*－フルオレン－９，９－ジイル－１，４－フェニレン］重付加物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が９％以下であるものに限る。）　(7)―4044

1731　２－メチル－２－［（２－メチルブタン－２－イル）ペルオキシ］ブタンを開始剤とし、末端に２－フェニルプロパ－２－エン－１－イル基及び２－フェニルプロパン－２－イル基を有する、２－エチルヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が７％以下であるものに限る。）　(6)―4180

1732　安息香酸ペルオキシ無水物、安息香酸＝３－メチル安息香酸＝ペルオキシ無水物、２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル＝２－エチルヘキサンペルオキソアート及び３－メチル安息香酸ペルオキシ無水物を開始剤とする、２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・ドデシル＝プロパ－２－エノアート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・プロパ－２－エンアミド・２－メチルプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4181

1733　安息香酸ペルオキシ無水物、安息香酸＝３－メチル安息香酸＝ペルオキシ無水物、２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル＝２－エチルヘキサンペルオキソアート及び３－メチル安息香酸ペルオキシ無水物を開始剤とする、アルキル（Ｃ＝９、分枝型）＝プロパ－２－エノアート・２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・ドデシル＝プロパ－２－エノアート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エンアミド・メチル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メトキシエチル＝プロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4182

1734　３－エチル－９，11（又は９，12）－ジメチル－６－オキソ－７，10，13－トリオキサ－３－アザヘキサデカン－15－イル＝３－（ジエチルアミノ）プロパノアート（又はプロパン－１，２－ジイルビス（オキシプロパン－１，２（又は２，１）－ジイル）＝ビス［３－（ジエチルアミノ）プロパノアート］）を主成分（70％以上）とする、*N*－エチルエタンアミンと２－［（１－｛２－［（プロパ－２－エノイル）オキシ］プロポキシ｝プロパン－２－イル）オキシ］プロピル＝プロパ－２－エノアートと２－（２－｛２－［（プロパ－２－エノイル）オキシ］プロポキシ｝プロポキシ）プロピル＝プロパ－２－エノアートとプロパン－１，２－ジイルビス（オキシプロパン－１，２－ジイル）＝ジ（プロパ－２－エノアート）とプロパン－１，２－ジイルビス（オキシプロパン－２，１－ジイル）＝ジ（プロパ－２－エノアート）の反応生成物　(2)―4321

1735　１－デオキシ－Ｄ－エリトリトール－１－イル＝６－*O*－アセチル－２，３－ビス－*O*－（アルカノイル（Ｃ＝６～14）又はアルケノイル（Ｃ＝６～14））－β－Ｄ－マンノピラノシドを主成分（90％以上）とする、｛［（９*Z*）－オクタデカ－９－エン酸と（９*Z*，12*Z*）－オクタデカ－９，12－ジエン酸と（９*Z*，12*Z*，15*Z*）－オクタデカ－９，12，15－トリエン酸とオクタデカン酸とヘキサデカ－９－エン酸とヘキサデカン酸］とプロパン－１，２，３－トリオールの３：１エステル｝を基質とする、酵母（*Pseudozyma tsukubaensis*）による産生物　(5)―7142

1736　ビス（４－｛［６－（アクリロイルオキシ）ヘキシル］オキシ｝フェニル）＝*trans*－シクロヘキサン－１，４－ジカルボキシラート　(3)―4756

1737　フラン－２，５－ジオン・４－メチル－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオン・５－メチル－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオン共重合物　(6)―4183

1738　*N*，*N*′′－（５－オキソ－４，６－ジアザ－１，９（1），３，７（1，４）－テトラベンゼナノナファン－1^{4}，9^{4}－ジイル）ビス（*N*′－ドデシル尿素）と*N*－［４－（｛４－［（ドデシルカルバモイル）アミノ］フェニル｝メチル）フェニル］－*N*′－オクチル尿素と*N*，*N*′′－［メチレンジ（４，１－フェニレン）］ビス（*N*′－ドデシル尿素）（主成分、80％以上）の混合物　(4)―2037

1739　*N*，*N*′′－［メチレンジ（４，１－フェニレン）］ビス［*N*′－（４－メチルフェニル）尿素］　(4)―2038

1740　*tert*－ブチル＝２－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とする、アルキル（Ｃ＝12～15，直鎖型及び分枝型）＝２－メチルプロパ－２－エノアート・オクタデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ヘキサデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4184

1741　エチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・（２*E*）－４－ブトキシ－４－オキソブタ－２－エン酸共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4185

1742　２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・エテニルベンゼン・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート共重合物とオキセパン－２－オンの付加反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4186

1743　２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・［２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・（２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸（Ｃ＝36）・ヘキサン－１，６－ジオール・ベンゼン－１，３－ジカルボン酸重縮合物）・１，３－ビス（２－イソシアナトプロパン－２－イル）ベンゼン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物］重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4045