1744　ジメチル＝２，２′－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする、１－エテニル－４－（１－エトキシエトキシ）ベンゼン・４－エテニルフェノール共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4187

1745　オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと（２－メチルブタン－２－イル＝２－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とし、ドデカン－１－チオールを連鎖移動剤とする、２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・*tert*－ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸・１－ベンジル－１*H*－ピロール－２，５－ジオン・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）のエステル化反応生成物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4188

1746　３－（トリメトキシシリル）プロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・ベンジル＝プロパ－２－エノアート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4189

1747　１，６－ジイソシアナトヘキサン・α－（６－ヒドロキシヘキシル（又は５－ヒドロキシ－３－メチルペンチル））－ω－ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オキシカルボニルオキシ（３－メチルペンタン－１，５－ジイル）］・α－ヒドロ－ω－（４－ヒドロキシブトキシ（又は（６－ヒドロキシヘキシル）オキシ））ポリ（オキシブタン－１，４－ジイルオキシヘキサンジオイル／オキシヘキサン－１，６－ジイルオキシヘキサンジオイル）・ブタン－１，４－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4046

1748　［エタン－１，２－ジオールと（オキセパン－２－オン重付加物）の１：２エステル］・２，２′－［１，４－フェニレンビス（オキシ）］ジ（エタン－１－オール）・１，１′－メチレンビス（４－イソシアナトベンゼン）重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4047

1749　３－スルファニルプロパン－１，２－ジオール・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無水物重付加物を連鎖移動剤とする、（３－エチルオキセタン－３－イル）メチル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・*tert*－ブチル＝アクリラート・*tert*－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4048

1750　５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・１，３－ジイソシアナト－２－メチルベンゼン・２，４－ジイソシアナト－１－メチルベンゼン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）重付加物と２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと（３－［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］－２，２－ビス｛［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝プロパン－１－オールを主成分とする、３－クロロプロパ－１－エンと２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールの反応生成物）の付加反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が４％以下であるものに限る。）　(7)―4049

1751　α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とリグニンの縮合反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4050

1752　６－メチルオクタ－５－エン－２－オンと２－メトキシ－６－メチルオクタ－１，５－ジエンと２－メトキシ－６－メチルオクタ－２，５－ジエンの混合物　(2)―4322

1753　２－（ブロモメチル）アクリル酸エチル　(2)―4323

1754　二銀＝エチンジイド　(2)―4324

1755　二ナトリウム＝α－（３－カルボキシラト－３－スルホナトプロパノイル）－ω－［モノ（又はビス又はトリス）（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）を主成分とする、（亜硫酸水素ナトリウムと亜硫酸二ナトリウムと｛α－［ビス（１－フェニルエチル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－［トリス（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－［（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とフラン－２，５－ジオンのエステル化反応生成物のナトリウム塩｝の反応生成物）とα－ヒドロ－ω－［モノ（又はビス又はトリス）（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）の混合物　(7)―4051

1756　α－［ビス（１－フェニルエチル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－［トリス（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－［（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）の混合物　(7)―4052

1757　［１，３，５－トリス（６－イソシアナトヘキシル）－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオンを主成分とする、１，６－ジイソシアナトヘキサン重付加物］と（不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られるダイマー酸（Ｃ＝36を主成分とする。）の水素化反応生成物を還元して得られるダイマージオール（カルボキシ基をヒドロキシメチル基にしたものに限る。））の反応生成物　(7)―4053

1758　１－デオキシ－１－（ジメチルアミノ）－Ｄ－グルシトール　(2)―4325

1759　２－（４－アミノフェニル）－１*H*－１，３－ベンゾイミダゾール－５－アミン・オキソラン－２，５－ジオン・２，２′－ジメチル［１，１′－ビフェニル］－４，４′－ジアミン・テトラヒドロ－１*H*－５，９－メタノピラノ［３，４－*d*］オキセピン－１，３，６，８（４*H*）－テトラオン重付加物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4054

1760　［１，１′－（オクタヒドロ－１*H*－４，７－メタノインデン－１，５－ジイル）ジメタノール・１，１′－（オクタヒドロ－１*H*－４，７－メタノインデン－１，６－ジイル）ジメタノール・１，１′－（オクタヒドロ－１*H*－４，７－メタノインデン－２，５－ジイル）ジメタノール・ジフェニル＝カルボナート重縮合物］・｛３－クロロプロパ－１－エンと２－［（４－ヒドロキシフェニル）メチル］フェノールと２，２′－メチレンジフェノールと４，４′－メチレンジフェノールのエーテル化及びクライゼン転位反応生成物｝重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4055

1761　末端に｛［（４－*tert*－ブチルシクロヘキシル）オキシ］カルボニル｝オキシ基を有する、エテニルベンゼン・４－オキソ－４－｛２－［（プロパ－２－エノイル）オキシ］エトキシ｝ブタン酸・２，３－ジヒドロキシプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－フェニル－１*H*－ピロール－２，５－ジオン・*tert*－ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4190

1762　ナフタレン－２，６－ジカルボン酸・４－ヒドロキシ安息香酸・［１，１′－ビフェニル］－４，４′－ジオール・ベンゼン－１，４－ジオール・ベンゼン－１，３－ジカルボン酸・ベンゼン－１，４－ジカルボン酸重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―4056

1763　硫黄と（５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン・エテン・プロペン共重合物）と*N*－［（１，３－ベンゾチアアゾール－２－イル）スルファニル］－２－メチルプロパン－２－アミンの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4191