1788　［α－｛1－（アルキル（C＝10～14，分枝型）オキシ）－3－［(プロパ－2－エン－1－イル）オキシ］プロパン－2－イル｝－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）を主成分とする，(アルカノール（C＝10～14，分枝型）と｛［(プロパ－2－エン－1－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物）・オキシラン重付加物］・［アンモニウム＝α－｛1－（アルキル（C＝10～14，分枝型）オキシ）－3－［(プロパ－2－エン－1－イル）オキシ］プロパン－2－イル｝－ω－（スルホナトオキシ)ポリ(オキシエタン－1，2－ジイル）を主成分とする，(アルカノール(C＝10～14，分枝型)と｛［(プロパ－2－エン－1－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のアンモニウム塩］・2－エチルヘキシル＝プロパ－2－エノアート・エテニルベンゼン・シクロヘキシル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—4066

1789　｛［α－｛1－（アルキル（C＝10～14，分枝型）オキシ）－3－［(プロパ－2－エン－1－イル）オキシ］プロパン－2－イル｝－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）を主成分とする，(アルカノール（C＝10～14，分枝型）と｛［(プロパ－2－エン－1－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物）・オキシラン重付加物］・［アンモニウム＝α－｛1－（アルキル（C＝10～14，分枝型）オキシ）－3－［(プロパ－2－エン－1－イル）オキシ］プロパン－2－イル｝－ω－（スルホナトオキシ)ポリ(オキシエタン－1，2－ジイル）を主成分とする，(アルカノール(C＝10～14，分枝型)と｛［(プロパ－2－エン－1－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のアンモニウム塩］・シクロヘキシル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・3－（トリメトキシシリル）プロピル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・ブチル＝プロパ－2－エノアート・ブチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート共重合物の加水分解反応生成物｝重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—4067

1790　ナトリウム＝2－メチルプロパ－2－エン－1－スルホナート・プロパ－2－エンアミド・メチリデンブタン二酸共重合物のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—4203

1791　アクリル酸エチル・アクリル酸＝2－ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル共重合物のメタクリル酸＝2－イソシアナトエチル付加物（水及び酸に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—4204

1792　オキシラニルメチル＝2－メチルプロパ－2－エノアートと［3－(オクタデセニル）オキソラン－2，5－ジオンとセルロースと3－（ヘキサデセニル)オキソラン－2，5－ジオンのエステル化反応生成物］のエステル化反応生成物のカリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウム塩（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)—4068

1793　2－エチルヘキサノイル＝クロリドとセルロースとナフタレン－2－カルボン酸とプロパン酸無水物のエステル化反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—4069

1794　フラン－2，5－ジカルボン酸　(5)—7144

1795　メタクリル酸・メタクリル酸シクロヘキシル・メタクリル酸メチル共重合物のメタクリル酸＝2，3－エポキシプロピル付加物　(6)—4205

1796　*N*，*N*′′－（2－メチル－1，3－フェニレン）ビス［*N*′－(4－メチルフェニル）尿素］と*N*，*N*′′－（4－メチル－1，3－フェニレン）ビス［*N*′－（4－メチルフェニル）尿素］の混合物　(3)—4758

1797　*N*，*N*′′－（2－メチル－1，3－フェニレン）ビス（*N*′－オクチル尿素）と*N*，*N*′′－（4－メチル－1，3－フェニレン）ビス（*N*′－オクチル尿素）と*N*，*N*′′－（2－メチル－1，3－フェニレン）ビス［*N*′－（4－メチルフェニル）尿素］と*N*，*N*′′－（4－メチル－1，3－フェニレン）ビス［*N*′－（4－メチルフェニル）尿素］と*N*－（2－メチル－3－｛［(4－メチルフェニル）カルバモイル］アミノ｝フェニル）－*N*′－オクチル尿素と*N*－（2－メチル－5－｛［(4－メチルフェニル）カルバモイル］アミノ｝フェニル）－*N*′－オクチル尿素と*N*－（4－メチル－3－｛［(4－メチルフェニル）カルバモイル］アミノ｝フェニル）－*N*′－オクチル尿素の混合物　(3)—4759

1798　4，4－ジメチル－2，6－ジオキサ－1（4），7(5)－ビス(［2］ベンゾフラナ）－3，5（1，4)－ジベンゼナヘプタファン－1^{1}，1^{3}，7^{1}，7^{3}－テトラオンと4，4－ジメチル－2，6－ジオキサ－1，7（5）－ビス(［2］ベンゾフラナ）－3，5（1，4）－ジベンゼナヘプタファン－1^{1}，1^{3}，7^{1}，7^{3}－テトラオン(主成分、90%以上）と1^{2}，4，4－トリメチル－$1^{1}H$－2，6－ジオキサ－1（5）－イソインドラ－7（5)－[2]ベンゾフラナ－3，5(1，4）－ジベンゼナヘプタファン－1^{1}，1^{3}，7^{1}，7^{3}（$1^{2}H$）－テトラオンの混合物　(5)—7145

1799　6－ジアゾ－5－オキソ－5，6－ジヒドロナフタレン－1－スルホン酸と4－［ビス（5－シクロヘキシル－4－ヒドロキシ－2－メチルフェニル）メチル］ベンゼン－1，2－ジオールのエステル化反応生成物　(4)—2040

1800　［1－デオキシ－1－(*N*－メチルオクタンアミド)－D－グルシトールと1－デオキシ－1－(*N*－メチルデカンアミド)－D－グルシトール］を主成分とする，*N*－メチル－*N*－（2，3，4，5，6－ペンタヒドロキシヘキシル)オクタンアミドと*N*－メチル－*N*－(2，3，4，5，6－ペンタヒドロキシヘキシル）デカンアミドの混合物　(2)—4327

1801　亜ジチオン酸亜鉛とマグネシウム＝ビス（オキソアセタート）の反応生成物　(2)—4328

1802　4－［1－（2，3－ジメチルフェニル)エチル］－1*H*－イミダゾール　(5)—7146

1803　［2－エチル－2－（ヒドロキシメチル）プロパン－1，3－ジオールと（クロロメチル）オキシランの縮合反応生成物］と（2－エチルヘキシル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・ベンジル＝プロパ－2－エノアート・2－メチルプロパ－2－エン酸共重合物のナトリウム塩）のエステル化反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)—4206

1804　［2，2－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－1，3－ジオール・メチルオキシラン重付加物］・ヒマシ油脂肪酸重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—4070

1805　1－エテニルピロリジン－2－オン・プロパ－2－エン酸・*N*－（2－メチル－4－オキソペンタン－2－イル）プロパ－2－エンアミド共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—4207

1806　2，2′－ジアゼンジイルビス（2－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，4－エテニルフェニル＝アセタート・4－エテニルフェノール・1，7，7－トリメチルビシクロ［2．2．1］ヘプタン－2－イル＝プロパ－2－エノアート・ブチル＝プロパ－2－エノアート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が４％以下であるものに限る。）　(6)—4208