	（花らい球の色が紫の品種を除く。）、花らい球のこぶの凹凸（生育型が頂花らい型の品種に限る。）、花らい球のつぼみの大きさ、側花らいの発生（生育型が頂花らい型の品種に限る。）、収穫期、雄性不稔性、花の色	
（略）	（略）	（略）
（略）	草姿、草丈、葉群の高さ、株幅、葉身の外曲、葉身のねじれの有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の緑色部の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉身の斑の主な色、葉身の斑の二次色、葉身の斑の面積、葉身の中肋の色、茎の数、茎の長さ、頂小穂の長さ、頂小穂の幅、頂小穂の褐色の濃淡、側小穂の長さ、側小穂の幅、側小穂の果胞に対する鱗片の長さ、出穂期	（略）
（略）	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
タマガサノキ	樹姿、側枝の長さ、新葉のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁の波打ち、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニンの着色、花序の直径、花冠の長さ、花冠の幅、花冠裂片の色、雌ずいの長さ、雌ずいの長さ／花冠の長さ、花柱の色、果実の色	
（略）	（略）	（略）
（略）	草丈、草型、草姿（叢生品種に限る。）、分枝の粗密（叢生品種に限る。）、茎の色、たく葉の大きさ、葉柄の向き、葉柄の葉長に対する長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の先端裂片の相対的な長さ、葉の一次欠刻の深さ、葉の裂片縁部の重なり、葉の基部の形、葉の表面の光沢の強弱、葉の表面の緑色の濃淡、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum×morifolium品種を除く。）、葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum×morifolium品種を除く。）、葉の裏面の色（Chrysanthemum×	（略）

	い球のしまり、花らい球の渦巻き形成の明瞭性、花らい球の苞葉の有無、花らい球の茎の長さ、花らい球の茎の太さ、花らい球の茎の硬さ、花らい球の茎の色、側枝花らいの発生の有無、側枝花らいの発生の強弱、花の色、花の黄色の濃淡、収穫の早晩、開花期、雄性不稔性の有無	
（略）	（略）	（略）
オオシマカンスゲ	草姿、草丈、葉群の高さ、株幅、花茎の数、花茎の長さ、葉身の外曲の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の緑色部の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様、葉身の斑の色、葉身の斑の面積、葉身の中肋の色、雄小穂の長さ、雄小穂の幅、雄小穂の褐色の濃淡、雌小穂の長さ、雌小穂の幅、出穂期	（略）
（略）	（略）	（略）
ケンタウリウム　エリトラエア	（略）	（略）
（新設）	（新設）	
（略）	（略）	（略）
キク	草丈、草型、草姿（叢生品種に限る。）、分枝の粗密（叢生品種に限る。）、茎の色、たく葉の大きさ、葉柄の向き、葉柄の葉長に対する長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の先端裂片の相対的な長さ、葉の一次欠刻の深さ、葉の裂片縁部の重なり、葉の基部の形、葉の表面の光沢の強弱、葉の表面の緑色の濃淡、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum×morifolium品種を除く。）、葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum×morifolium品種を除く。）、葉の裏面の色（Chrysanthemum×	（略）