		疫病抵抗性、斑点病抵抗性、青枯病抵抗性、トマト黄化葉巻ウイルス抵抗性（イスラエル系統）
（略）	（略）	（略）
（略）	幼芽の大きさ、幼芽の基部の形、幼芽の基部のアントシアニン着色、幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合、幼芽の基部の毛、幼芽の頂部の基部に対する大きさ、幼芽の頂部の型、幼芽の頂部のアントシアニン着色、幼芽の頂部の毛、幼芽の根端の数、幼芽の側枝の長さ、植物体の草型、植物体の草姿、茎のアントシアニン着色、複葉の大きさ、小葉の重なり、二次小葉の数、葉の緑色の濃淡、複葉の中肋（ろく）のアントシアニン着色、第二側小葉の長幅比、頂小葉と側小葉の合着の出現率、花芽のアントシアニン着色、花房の数、花房の大きさ、花柄のアントシアニン着色、花冠の直径、花冠内面のアントシアニン着色、花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合、花冠内面のアントシアニン着色の広がり、植物体の草高、やくの色、枯ちょう期、塊茎の形、塊茎の目の数、塊茎の目の深さ、塊茎の皮色、塊茎の表皮の粗滑、塊茎の目の基部の色、塊茎の肉色、塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が黄白及び黄の品種に限る。）、休眠期間、上いも重、上いも数、上いもの平均重、肉質、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性、ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性	休眠期間、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性、ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性
（略）	（略）	（略）

（略）	（略）	（略）
バレイショ	幼芽の大きさ、幼芽の形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱、幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合、幼芽の基部の毛の多少、幼芽の頂部の基部に対する大きさ、幼芽の頂部の型、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱、幼芽の頂部の毛の多少、幼芽の根端の数、幼芽の側枝の長さ、植物体の草型、植物体の草姿、茎のアントシアニン着色の強弱、複葉の大きさ、小葉の重なり、二次小葉の出現度、複葉の緑色の濃淡、複葉の表面の中肋（ろく）のアントシアニン着色の強弱、第二側小葉の長幅比、頂小葉と側小葉の合着の出現率、花芽のアントシアニン着色の強弱、植物体の草高、花の数、花房の大きさ、花柄のアントシアニン着色の強弱、花冠の大きさ、花冠内面のアントシアニン着色の強弱、花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合、花冠内面のアントシアニン着色の広がり、やくの色、枯ちょう期、塊茎の形、塊茎の目の数、塊茎の目の深さ、塊茎の皮色、塊茎の目の基部の色、塊茎の表皮のネット、塊茎の肉色、塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）、休眠期間、上いも重、上いも数、上いもの平均重、肉質、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性	休眠期間、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性
（略）	（略）	（略）