（略）	菌糸密度、菌そう表面の着色の有無、菌そう裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、板状原基（気中菌糸）の割合、子実体株の直径、子実体株の高さ、花弁状菌さんの色、花弁状菌さんの形、花弁状菌さんの厚さ、花弁状菌さんの硬さ、花弁状菌さん周縁部の切れ込み割合、花弁状菌さんの密度、枝の色、枝の厚さ、枝の硬さ、菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の硬さ、菌柄の模様割合、最適培養期間、発生処理から収穫最盛期までの期間、子実体株の平均重量	（略）
（略）	（略）	（略）
（略）	草型、草丈、茎の長さ、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉型、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉柄の長さ、葉身の最大幅の位置、若葉の主な色、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の周縁の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）、花型、花の長さ、花の幅、花の色数、花の主な色、花の二次色、花冠裂片の幅、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）、花筒の長さ、花筒喉部の主な色（一重品種に限る。）	（略）
（略）	（略）	（略）
（略）	種子の色、種子のフェノール反応による着色（種子の色が紫及び青の品種を除く。）、しょう葉のアントシアニンの着色、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度、止め葉の葉耳のアントシアニン着色、出穂期、止め葉の葉しょうの白粉、止め葉の白粉、穂の白粉、穂首の白粉、護穎の外面の毛の有無、草丈、稈の長さ、穂首節直下の節間の髄の厚さ、粒着密度、穂の長さ、芒の有無、穂の先端の芒の長さ、穂の色、穂の形、穂軸の先端凸部表面の毛、護穎の肩部の幅、護穎の肩部の形、護穎の嘴の長さ、護穎の嘴の形、護穎の内側の毛、秔の色、粒の形、成熟期、	粒質、穂発芽性、コムギ縞萎縮病（病原性Ⅱ型）抵抗性、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現

はなびらたけ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（15℃／30日）、菌糸体の温度別生長速度（20℃／30日）、菌糸体の温度別生長速度（25℃／30日）、子実体の径、子実体の高さ、菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の肉質、子実体の枝の多少、子実体の花弁状片の形、子実体の枝の色、子実体の枝の厚さ、子実体の枝の肉質、子実体の発生型、原基形成発生最適温度、子実体の生育最適温度、発生最盛期までの期間（種菌接種から収穫適期までの期間）、発生操作から収穫期までの期間、収量	（略）
（略）	（略）	（略）
ステラ	草型、草丈、茎の長さ、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉型、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉柄の長さ、葉身の最大幅の位置、若葉の主な色（成葉の色と明確に異なる場合）、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の周縁の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）、花型、花の長さ、花の幅、花の色数、花の主な色、花の二次色、花冠裂片の幅、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）、花筒の長さ、花筒喉部の主な色（一重品種に限る。）	（略）
（略）	（略）	（略）
コムギ	種子の色、種子のフェノール反応による着色、しょう葉のアントシアニンの着色、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度、止め葉の葉耳のアントシアニンの着色、出穂期、止め葉の葉しょうの白粉、止め葉の白粉、穂の白粉、穂首の白粉、護穎の外面の毛の有無、草丈、稈の長さ、穂首節直下の節間の髄の厚さ、粒着密度、穂の長さ、芒の有無、穂の先端の芒の長さ、穂の色、穂の形、穂軸の先端凸部表面の毛、護穎の肩部の幅、護穎の肩部の形、護穎の嘴の長さ、護穎の嘴の形、護穎の内側の毛、秔の色、粒の形、成熟期、千粒重、胚乳の型、粒質、まき性、	粒質、穂発芽性、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現