加熱人血漿たん白	（略）	0	（略）
人血清アルブミン	（略）	0	（略）
乾燥人フィブリノゲン	（略）	0	（略）
乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	（略）	0	（略）
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	（略）	0	（略）
乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体	220,000円	0	機構
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	220,000円	0	機構
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子	（略）	0	（略）
（略）	（略）	（略）	（略）
乾燥スルホ化人免疫グロブリン	（略）	（略）	（略）

加熱人血漿たん白	（略）	内容量が100mL又は250mLであるとき。 １本	（略）
人血清アルブミン	（略）	内容量が20mL、50mL、100mL又は250mLであるとき。 １本	（略）
乾燥人フィブリノゲン	（略）	内容量が液状製剤として50mLに相当する量であるとき。 １本	（略）
乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	（略）	内容量が20mL又は40mLであるとき。 １本	（略）
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	（略）	内容量が液状製剤として５mL、10mL、15mL、20mL、25mL、30mL、40mL又は50mLに相当する量であるとき。 １本	（略）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子	（略）	内容量が液状製剤として2.5mL、５mL又は10mLに相当する量であるとき。 １本	（略）
（略）	（略）	（略）	（略）
乾燥スルホ化人免疫グロブリン	（略）	（略）	（略）